

Sortie SMBCN : Relevé Botanique, bryologique et mycologique du
Dimanche 07 octobre 2018

Bois de la Ville (St Laurent-de-Cerdans, Vallespir) : dynamique de la
végétation dans l'étage montagnard inférieur (800-1200 m)

Acer campestre L.
Acer opalus Miller
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Arctium minus (J. Hill) Bernh.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Betula pendula Roth
Bidens frondosa L.
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson
Blechnum spicant (L.) Roth
Buddleja davidii Franchet
Buxus sempervirens L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula glomerata L.
Castanea sativa Miller
Catananche caerulea L.
Centaurea decipiens Thuill.
Centaurea nigra L.
Centaurea pectinata L.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Clematis vitalba L.
Clinopodium vulgare L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.F. L'Herminier
Cytisus scoparius (L.) Link
Daphne laureola L.
Daucus carota L.
Consolida ajacis (L.) Schur
Syn= Delphinium ajacis L.
Digitalis lutea L.
Dipsacus fullonum L.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Erica arborea L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia nicaeensis All.
Euphrasia pectinata Ten.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis pyrenaica Bartl.
Galeopsis tetrahit L.
Gentianopsis ciliata (L.) Ma
Syn=Gentianella ciliata (L.) Borckh.
Helleborus foetidus L.
Hieracium gouanii Arvet-Touvet gr. cordifolium

Hieracium umbellatum L. gr.
Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen
 Syn= Coronilla emerus L.
Hypericum androsaemum L.
Ilex aquifolium L.
Juniperus communis L.
Knautia collina Gren. & Godron.
 Syn= Knautia timeroyi Jordan subsp. collina (Schübl. & Martens) Breistr.
Ligustrum vulgare L.
Lotus hirsutus L.
 Syn= Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Lotus dorycnium L.
 Syn= Dorycnium pentaphyllum Scop.
Lunaria annua L.
Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundinacea (Schrank) K. Richter
Odontites lanceolatus (Gaudin) Reichenb. subsp. olotensis (Pau ex Cadevall) O. Bolos & Vigo
Origanum vulgare L.
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch
Picea abies (L.) Karsten
Pinus nigra Arnold subsp. laricio Maire
Pinus strobus L.
Pinus sylvestris L.
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Potentilla reptans L.
Prenanthes purpurea L.
Prunella hastifolia Brot.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus ilex L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus humilis Miller
Quercus rubra L.
Robinia pseudoacacia L.
Salix atrocinerea Brot.
 Syn= Salix acuminata Miller
Salix caprea L.
Salix elaeagnos Scop.
Scabiosa triandra L.
Scrophularia nodosa L.
Senecio inaequidens DC.
Serratula tinctoria L.
Seseli montanum L.
Solanum nigrum L.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz

Succisa pratensis Moench
Symphyotricum pilosum (Willd.) G.L. Nesom
Syn= Aster pilosus Willd.
Syn= Aster ericoides var. pilosus (Willd) Porter
Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
Teucrium pyrenaicum L.
Teucrium scorodonia L.
Tilia platyphyllos Scop.
Torilis japonica (Houtt.) DC.
Vaccinium myrtillus L.
Verbena officinalis L.

Figurent en rouge les espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon identifiées
par les textes juridiques de protection (protection nationale, protection régionale,
Directive Habitats, Convention de Berne, liste provisoire des espèces déterminantes
pour les ZNIEFF)

Relevé mycologique

Amanita caesarea (Scop.) Pers
Amanita citrina Pers.
Boletus edulis Bull.
Cantharellus cibarius Fr.,
Clathrus archeri (Berk.) Dring
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
Clitocella mundula (Lasch) Kluting, T.J. Baroni & Bergemann
Cortinarius callochrous (Pers.) Gray
Craterellus cornucopioides (L.) Pers.,
Craterellus lutescens (Fr.) Fr.
Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
Hygrophorus lindtneri M.M. Moser
Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr.
Hymenopellis radicata (Rehder) R.H. Petersen
Laccaria laccata (Scop.) Cooke
Lactarius controversus Pers.
Lactarius necator (Bull.) Pers.
Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet
Lanzia echinophila (Bull.) Korf
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
Leccinum cyaneobasileucum Lannoy & Estadès
Leccinum scabrum (Bull.) Gray
Lycoperdon pyriforme Schaeff.
Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner
Mycena meliigena (Berk. & Cooke) Sacc.
Russula betularum Hora
Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr
Russula silvestris (Singer) Reumaux
Schizophyllum commune Fr.
Scleroderma citrinum Pers.
Suillellus queletii (Schulzer) Vizzini, Simonini & Gelardi
Tricholoma acerbum (Bull.) Quél.

Bryophytes		
Hépatiques		
Nom scientifique	Localisation	Station
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum.	Font de la Roca del Corb	Source, ombragée, bois feuillus
Liochlaena lanceolata Nees		Source, ombragée
Metzgeria furcata (L.) Dum.		source, ombragée, bois feuillus
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.	Comall de l'Orri	tuf
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Loeske	Font de la Roca del Corb	Source, ombragée, bois feuillus
Mousses		
Nom scientifique	localisation	Station
Atrichum angustatum (Brid.) B. & S.	Comall fosc	sol de piste sous bois feuillus
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. (1)		talus de piste, landes boisées
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce		tuf
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	Font de la Roca del Corb	bords de ru, bois feuillus
Fissidens dubius P. Beauv.		bords de ru, bois feuillus
Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats.		Source, ombragée, bois feuillus
Hookeria lucens (Hedw.) Sm. (2)		Source, ombragée, dans la zone d'éclaboussement
Isoetecium myosuroides Brid.		Bois feuillus
Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. (3)		hêtraie mélangée, pied des arbres
Thuidium tamariscinum (Hedw.) B., S. & G.		bords de ru, bois feuillus
(1) invasive très problématique		
(2) rare: seule station du département		
(3) localement caractéristique: sols acides relativement frais		