

Liste des plantes présentées lors de l'exposition botanique et mycologique organisée par la SMBCN et la SMAM le 20 octobre 2024 à Perpignan



| Nom botanique | famille | Nom français |
|---|----------------|----------------------------------|
| <i>Abies alba</i> Mill. | Pinaceae | Sapin pectiné |
| <i>Acer campestre</i> L. | Sapindaceae | Érable champêtre |
| <i>Acer monspessulanum</i> L. | Sapindaceae | Érable de Montpellier |
| <i>Acer opalus</i> Mill. | Sapindaceae | Érable à feuilles d'Obier |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. | Betulaceae | Aulne glutineux |
| <i>Amaranthus deflexus</i> L. | Amaranthaceae | Amarante étalée |
| <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd. | Plantaginaceae | Muflier à feuilles de Pâquerette |
| <i>Arbutus unedo</i> L. | Ericaceae | Arbousier |
| <i>Artemisia campestris</i> L. | Asteraceae | Armoise champêtre |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Asteraceae | Herbe de feu |
| <i>Arundo donax</i> L. | Poaceae | Canne de Provence |
| <i>Asparagus acutifolius</i> L. | Asparagaceae | Asperge sauvage |
| <i>Asparagus</i> sp. | Asparagaceae | Asperge |
| <i>Atriplex halimus</i> L. | Amaranthaceae | Atriplex |
| <i>Betula pendula</i> Roth | Betulaceae | Bouleau verruqueux |
| <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C.H.Stirt. | Fabaceae | Trèfle bitumineux |
| <i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv. | Poaceae | Brachypode rameux |
| <i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin | Cucurbitaceae | Bryone dioïque |
| <i>Bupleurum fruticosum</i> L. | Apiaceae | Buplèvre en buisson |
| <i>Buxus sempervirens</i> L. | Buxaceae | Buis sempervirent |

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| <i>Calendula arvensis</i> L. | Asteraceae | Soucis |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | Ericaceae | Callune |
| <i>Carex pendula</i> Huds. | Cyperaceae | Laîche pendante |
| <i>Castanea sativa</i> Mill. | Fagaceae | Châtaignier commun |
| <i>Celtis australis</i> L. | Cannabaceae | Micocoulier |
| <i>Centaurea aspera</i> L. | Asteraceae | Centaurée rude |
| <i>Centaurea nigra</i> L. | Asteraceae | Centaurée noire |
| <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. | Caprifoliaceae | Valériane rouge |
| <i>Ceratonia siliqua</i> L. | Fabaceae | Caroubier |
| <i>Chenopodium album</i> L. | Amaranthaceae | Senousse |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | Asteraceae | Barbe-de-capucin |
| <i>Cistus albidus</i> L. | Cistaceae | Ciste blanchâtre |
| <i>Cistus crispus</i> L. | Cistaceae | Ciste crispé |
| <i>Cistus laurifolius</i> L. | Cistaceae | Ciste à feuilles de Laurier |
| <i>Cistus monspeliensis</i> L. | Cistaceae | Ciste de Montpellier |
| <i>Cistus salviifolius</i> L. | Cistaceae | Ciste à feuilles de Sauge |
| <i>Clematis flammula</i> L. | Ranunculaceae | Clématite odorante |
| <i>Clematis vitalba</i> L. | Ranunculaceae | Herbe aux gueux |
| <i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze | Lamiaceae | Calament glanduleux |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L. | Lamiaceae | Grand Basilic |
| <i>Cneorum tricoccon</i> L. | Rutaceae | Camélée à trois coques |
| <i>Convolvulus althaeoides</i> L. | Convolvulaceae | Liseron fausse Guimauve |
| <i>Coriaria myrtifolia</i> L. | Coriariaceae | Corroyère |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | Cornaceae | Cornouiller sanguin |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Betulaceae | Noisetier |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Rosaceae | Aubépine |
| <i>Crocus nudiflorus</i> Sm. | Iridaceae | Crocus à fleurs nues |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. | Cupressaceae | Cyprès de Provence |
| <i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang | Fabaceae | Cytise à feuilles sessiles |
| <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al. | Fabaceae | Genêt purgatif |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link | Fabaceae | Genêt à balais |
| <i>Cytisus spinosus</i> (L.) Bubani | Fabaceae | Calycotome |
| <i>Cytisus villosus</i> Pourr. | Fabaceae | Cytise velu |
| <i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman | Poaceae | Dactyle d'Espagne |
| <i>Daphne gnidium</i> L. | Thymelaeaceae | Daphné garou |
| <i>Daphne laureola</i> L. | Thymelaeaceae | Laurier des bois |
| <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler | Poaceae | |
| <i>Diplotaxis eruroides</i> (L.) DC. | Brassicaceae | Roquette blanche |
| <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC. | Brassicaceae | Roquette jaune |

| | | |
|--|---------------|---------------------------|
| <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter | Asteraceae | Inule visqueuse |
| <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. | Fabaceae | Dorycnie à cinq feuilles |
| <i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich. | Cucurbitaceae | Concombre sauvage |
| <i>Echium vulgare</i> L. | Boraginaceae | Vipérine vulgaire |
| <i>Ephedra distachya</i> L. | Ephedraceae | Raisin-de-mer |
| <i>Erica arborea</i> L. | Ericaceae | Bruyère en arbre |
| <i>Erica scoparia</i> L. | Ericaceae | Bruyère à balais |
| <i>Eryngium campestre</i> L. | Apiaceae | Panicaut champêtre |
| <i>Euonymus europaeus</i> L. | Celastraceae | Bonnet-d'évêque |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | Asteraceae | Chanvre d'eau |
| <i>Euphorbia characias</i> L. | Euphorbiaceae | Euphorbe des vallons |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | Euphorbiaceae | Euphorbe faux Cyprès |
| <i>Euphorbia peplus</i> L. | Euphorbiaceae | Euphorbe Omblette |
| <i>Euphorbia segetalis</i> L. | Euphorbiaceae | Euphorbe des moissons |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. | Fagaceae | Hêtre |
| <i>Ferula communis</i> L. | Apiaceae | Férule |
| <i>Ficus carica</i> L. | Moraceae | Figuier |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | Apiaceae | Fenouil |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl | Oleaceae | Frêne à feuilles étroites |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Oleaceae | Frêne commun |
| <i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter | Asteraceae | Aster âcre |
| <i>Galium maritimum</i> L. | Rubiaceae | Gaillet maritime |
| <i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S.Johnson | Fabaceae | Genêt de Montpellier |
| <i>Genista scorpius</i> (L.) DC. | Fabaceae | Genêt scorpion |
| <i>Hedera helix</i> L. | Araliaceae | Lierre |
| <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench | Asteraceae | Immortelle jaune |
| <i>Heliotropium europaeum</i> L. | Boraginaceae | Héliotrope d'Europe |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | Ranunculaceae | Pied-de-griffon |
| <i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch | Apiaceae | Ache nodiflore |
| <i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf | Poaceae | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | Hypericaceae | Milleperthuis |
| <i>Ilex aquifolium</i> L. | Aquifoliaceae | Houx |
| <i>Juglans regia</i> L. | Juglandaceae | Noyer |
| <i>Juncus acutus</i> L. | Juncaceae | Jonc à tépales pointus |
| <i>Juncus maritimus</i> Lam. | Juncaceae | Jonc maritime |
| <i>Juniperus communis</i> L. | Cupressaceae | Genévrier commun |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> L. | Cupressaceae | Genévrier cade |
| <i>Juniperus phoenicea</i> L. | Cupressaceae | Genévrier de Phénicie |
| <i>Kali soda</i> Moench | Amaranthaceae | Salsovie |

| | | |
|--|----------------|----------------------------------|
| <i>Lagurus ovatus</i> L. | Poaceae | Queue de lièvre |
| <i>Larix decidua</i> Mill. | Pinaceae | Mélèze d'Europe |
| <i>Laurus nobilis</i> L. | Lauraceae | Laurier-sauce |
| <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. | Lamiaceae | Lavande officinale |
| <i>Lavandula stoechas</i> L. | Lamiaceae | Lavande à toupet |
| <i>Lepidium graminifolium</i> L. | Brassicaceae | Passerage à feuilles de Graminée |
| <i>Limbarda crithmoides</i> (L.) Dumort. | Asteraceae | Inule faux Crithme |
| <i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Borbás | Plantaginaceae | Linaire d'Italie |
| <i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv. | Brassicaceae | Alysse maritime |
| <i>Lonicera xylosteum</i> L. | Caprifoliaceae | Camérisier à balais |
| <i>Malus sylvestris</i> Mill. | Rosaceae | Pommier sauvage |
| <i>Malva sylvestris</i> L. | Malvaceae | Mauve sauvage |
| <i>Melittis melissophyllum</i> L. | Lamiaceae | Mélitte à feuilles de Mélisse |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | Lamiaceae | Menthe à feuilles rondes |
| <i>Mercurialis tomentosa</i> L. | Euphorbiaceae | Mercuriale tomenteuse |
| <i>Myrtus communis</i> L. | Myrtaceae | Myrte commun |
| <i>Nerium oleander</i> L. | Apocynaceae | Laurier-rose |
| <i>Olea europaea</i> L. | Oleaceae | Olivier d'Europe |
| <i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Rser & Hamasha | Poaceae | Piptathère faux Millet |
| <i>Ononis</i> sp | Fabaceae | |
| <i>Origanum vulgare</i> L. | Lamiaceae | Origan commun |
| <i>Osyris alba</i> L. | Santalaceae | Rouvet blanc |
| <i>Parietaria judaica</i> L. | Urticaceae | Pariétaire diffuse |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> L. | Oleaceae | Filaire à feuilles étroites |
| <i>Phillyrea media</i> L. | Oleaceae | Filaire intermédiaire |
| <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. | Poaceae | Roseau |
| <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst. | Pinaceae | Epicéa |
| <i>Picris hieracioides</i> L. | Asteraceae | Herbe aux vermisses |
| <i>Pinus halepensis</i> Mill. | Pinaceae | Pin d'Alep |
| <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin | Pinaceae | Pin à crochets |
| <i>Pinus nigra</i> Arnold | Pinaceae | Pin noir d'Autriche |
| <i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire | Pinaceae | Pin laricio de Corse |
| <i>Pinus pinaster</i> Aiton | Pinaceae | Pin mésogéen |
| <i>Pinus sylvestris</i> L. | Pinaceae | Pin sylvestre |
| <i>Pistacia lentiscus</i> L. | Anacardiaceae | Lentisque |
| <i>Pistacia terebinthus</i> L. | Anacardiaceae | Térébinthe |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantaginaceae | Plantain lancéolé |
| <i>Plantago sempervirens</i> Crantz | Plantaginaceae | Plantain toujours vert |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------|
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce | Asparagaceae | Sceau de Salomon |
| <i>Polygonum aviculare</i> L. | Polygonaceae | Renouée des oiseaux |
| <i>Populus alba</i> L. | Salicaceae | Peuplier blanc |
| <i>Populus nigra</i> L. | Salicaceae | Peuplier noir |
| <i>Portulaca oleracea</i> L. | Portulacaceae | Porcelane |
| <i>Prenanthes purpurea</i> L. | Asteraceae | Préanthes |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L. | Rosaceae | Cerisier des bois |
| <i>Prunus mahaleb</i> L. | Rosaceae | Cerisier mahaleb |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Rosaceae | Prunelier |
| <i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz | Brassicaceae | Arabette Tourette |
| <i>Punica granatum</i> L. | Lythraceae | Grenadier commun |
| <i>Pyrus spinosa</i> Forssk. | Rosaceae | Poirier à feuilles d'Amandier |
| <i>Quercus coccifera</i> L. | Fagaceae | Chêne Kermès |
| <i>Quercus ilex</i> L. | Fagaceae | Chêne vert |
| <i>Quercus petraea</i> Liebl. | Fagaceae | Chêne sessile |
| <i>Quercus pubescens</i> Willd. | Fagaceae | Chêne pubescent |
| <i>Quercus suber</i> L. | Fagaceae | Chêne liège |
| <i>Reseda alba</i> L. | Resedaceae | Réséda blanc |
| <i>Rhamnus alaternus</i> L. | Rhamnaceae | Nerprun Alaterne |
| <i>Rosa rubiginosa</i> L. | Rosaceae | Rosier à odeur de pomme |
| <i>Rosa</i> sp. | Rosaceae | |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> L. | Lamiaceae | Romarin |
| <i>Rubia peregrina</i> L. | Rubiaceae | Garance voyageuse |
| <i>Rubia tinctorum</i> L. | Rubiaceae | Garance des teinturiers |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L. | Asparagaceae | Buis piquant |
| <i>Ruta</i> sp. | Rutaceae | |
| <i>Salicornia europaea</i> L. | Amaranthaceae | Salicorne d'Europe |
| <i>Salix caprea</i> L. | Salicaceae | Saule des chèvres |
| <i>Salix cinerea</i> L. | Salicaceae | Saule cendré |
| <i>Salix viminalis</i> L. | Salicaceae | Osier blanc |
| <i>Sambucus ebulus</i> L. | Adoxaceae | Sureau yeble |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | Adoxaceae | Sureau noir |
| <i>Sambucus racemosa</i> L. | Adoxaceae | Sureau de montagne |
| <i>Saponaria officinalis</i> L. | Caryophyllaceae | Saponaire officinale |
| <i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják | Cyperaceae | Scirpe-jonc |
| <i>Scolymus hispanicus</i> L. | Asteraceae | Chardon d'Espagne |
| <i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau | Crassulaceae | Sédum de Nice |
| <i>Seseli montanum</i> L. | Apiaceae | Séséli des montagnes |
| <i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv. | Poaceae | Panic verticillé |
| <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet | Caryophyllaceae | Silène des prés |

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| <i>Smilax aspera</i> L. | Smilacaceae | Salsepareille |
| <i>Smyrnum olusatrum</i> L. | Apiaceae | Maceron |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. | Asteraceae | Verge d'Or |
| <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz | Rosaceae | Alisier blanc |
| <i>Sorbus domestica</i> L. | Rosaceae | Sorbier domestique |
| <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. | Poaceae | Sorgo d'Alep |
| <i>Spartium junceum</i> L. | Fabaceae | Spartier |
| <i>Sporobolus pungens</i> (Schreb.) Kunth | Poaceae | Sporobole piquant |
| <i>Suaeda vera</i> Forssk. ex J.F.Gmel. | Amaranthaceae | Suéda fruticuleux |
| <i>Tamaris</i> sp. | Tamaricaceae | |
| <i>Taraxacum</i> sp. | Asteraceae | |
| <i>Teucrium polium</i> L. | Lamiaceae | Germandrée tomenteuse |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L. | Lamiaceae | Germandrée scorodoine |
| <i>Tilia cordata</i> Mill. | Malvaceae | Tilleul des bois |
| <i>Trifolium arvense</i> L. | Fabaceae | Trèfle Pied-de-lièvre |
| <i>Trifolium pratense</i> L. | Fabaceae | Trèfle violet |
| <i>Ulex parviflorus</i> Pourr. | Fabaceae | Ajonc à petites fleurs |
| <i>Ulmus minor</i> Mill. | Ulmaceae | Orme champêtre |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Urticaceae | Ortie dioïque |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | Ericaceae | Myrtille |
| <i>Viburnum tinus</i> L. | Adoxaceae | Viorne Tin |
| <i>Vitex agnus-castus</i> L. | Lamiaceae | Gattilier |
| <i>Vitis vinifera</i> L. | Vitaceae | Vigne cultivée |

Espèces exotiques naturalisées inscrites dans la liste des plantes invasives d'Occitanie (de la catégorie « Majeure » à la catégorie « Prévention »)

| Nom botanique | famille | Nom français |
|---|------------------|----------------------------------|
| <i>Acacia dealbata</i> Link | Fabaceae | Mimosa argenté |
| <i>Acer negundo</i> L. | Sapindaceae | Érable Négondo |
| <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle | Simaroubaceae | Faux Vernis du Japon |
| <i>Araujia sericifera</i> Brot. | Apocynaceae | Araujia |
| <i>Baccharis halimifolia</i> L. | Asteraceae | Baccharis à feuilles d'Halimione |
| <i>Bidens frondosa</i> L. | Asteraceae | Bident feuillu |
| <i>Buddleja davidii</i> Franch. | Scrophulariaceae | Arbre aux papillons |
| <i>Carpobrotus acinaciformis</i> (L.) L.Bolus | Aizoaceae | Griffes de sorcières |
| <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. | Poaceae | Herbe de la Pampa |
| <i>Datura stramonium</i> L. | Solanaceae | Datura officinale |
| <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | Elaeagnaceae | Olivier de Bohème |
| <i>Euphorbia prostrata</i> Aiton | Euphorbiaceae | Euphorbe prostrée |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | Asteraceae | Galinsoga à petites fleurs |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| <i>Medicago arborea</i> L. | Fabaceae | Luzerne en arbre |
| <i>Oenothera biennis</i> L. | Onagraceae | Onagre bisannuelle |
| <i>Paspalum dilatatum</i> Poir. | Poaceae | Paspale dilaté |
| <i>Phytolacca americana</i> L. | Phytolaccaceae | Phytolaque américaine |
| <i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton | Pittosporaceae | Arbre des Hottentots |
| <i>Reynoutria japonica</i> Houtt. | Polygonaceae | Renouée du Japon |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | Fabaceae | Robinier |
| <i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill. | Solanaceae | Muguet des pampas |
| <i>Senecio inaequidens</i> DC. | Asteraceae | Sénéçon sud-africain |
| <i>Solanum chenopodioides</i> Lam. | Solanaceae | Morelle sublobée |
| <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. | Poaceae | Sporobole tenace |
| <i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter | Asteraceae | Lampourde d'Italie |

Espèces exotiques, naturalisées ou non, qui ne sont pas considérées comme invasives

| Nom botanique | famille | Nom français |
|---|---------------|----------------------|
| <i>Campsis radicans</i> (L.) Bureau | Bignoniaceae | Bignone de Virginie |
| <i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq. | Casuarinaceae | Pin d'Australie |
| <i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl.) Carrière | Pinaceae | Cèdre de l'Atlas |
| <i>Crassula ovata</i> E.Mey. ex Harv. & Sond. | Crassulaceae | |
| <i>Brugmansia</i> Pers. Sp. | Solanaceae | ex <i>Datura</i> sp. |
| <i>Eucalyptus</i> sp. | Myrtaceae | |
| <i>Persea americana</i> Mill. | Lauraceae | Avocatier |
| <i>Quercus ithaburensis</i> subsp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge & Yalt. | Fagaceae | Chêne du Mont Thabor |
| <i>Rhaphiolepis bibas</i> | Rosaceae | Néflier du Japon |
| <i>Senna corymbosa</i> (Lam.) H.S. Irwin | Fabaceae | Séné en corymbe |
| <i>Tradescantia pallida</i> | Commelinaceae | Misère pourpre |
| <i>Ziziphus zizyphus</i> (L.) Meikle | Rhamnaceae | Jujubier |

Pteridophytes

| Nom botanique | famille | Nom français |
|--|------------------|----------------------------|
| <i>Asplenium onopteris</i> L. | Aspleniaceae | Doradille des ânes |
| <i>Asplenium trichomanes</i> L. | Aspleniaceae | Doradille cheveux de Vénus |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott | Dryopteridaceae | Fougère mâle |
| <i>Equisetum arvense</i> L. | Equisetaceae | Queue-de-renard |
| <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn. | Dryopteridaceae | Aspidium à cils raides |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn | Dennstaedtiaceae | Fougère Aigle |

Bryophytes:

| Nom botanique | famille |
|---|------------------|
| Hépatique | |
| <i>Apopellia endiviifolia</i> (Dicks.) Nebel & D.Quandt | Pelliaceae |
| Mousses | |
| <i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce | Amblystegiaceae |
| <i>Eurynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp. | Brachytheciaceae |
| <i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw. var. <i>cupressiforme</i> | Hypnaceae |
| <i>Hypnum resupinatum</i> Taylor | Hypnaceae |
| <i>Isoetecium myosuroides</i> Brid. | Lembophyllaceae |
| <i>Orthotrichum pallens</i> Bruch. Ex Brid. | Orthotrichaceae |
| <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) M.Fleisch. | Brachytheciaceae |
| <i>Tortella squarrosa</i> (Brid.) Limpr. | Pottiaceae |
| <i>Zygodon rupestris</i> (Schimp.) ex Lorentz | Orthotrichaceae |