

DETERMINATIONS DU 20 10 2024 - EXPOSITION SMBCN / SMAM

Familles	Genres Espèces valides	Habitat	Noms Français	Odeur	Trophisme	COMESTIBLE
6B1	Agaricus annae	Surtout sous épicéas sur sol calcaire.	agaric (psalliotte) d'anna		S	SANS INTERET
6B1	Agaricus arvensis	Dans l'herbe, les clairières et en lisière de forêts, jusqu'en zone alpine.	agaric (psalliotte) des jachères,	Anis	S	COMESTIBLE
6B1	Agaricus bitorquis	Sur le gazon, les trottoirs, les bords de chemins dans les jardins et les parcs.	agaric (psalliotte) des trottoirs		S	SANS INTERET
6B1	Agaricus silvaticus	Surtout sous conifères sur sol acide (rare sous feuillus).	agaric (psalliotte) des forêts		S	COMESTIBLE
6B1	Agaricus xanthodermus	Dans les bois et les parcs, surtout sous feuillus.	agaric (psalliotte) jaunissant	Iode Encre	S	TOXIQUE
27E	Aleuria aurantia	A terre sur sol argilo-sableux (bords de chemins, talus, fossés,...).	pézize orangée			SANS INTERET
6B3	Amanita caesarea	Surtout dans le sud sous les feuillus (chênes, châtaigniers...).	amanite des césars, oronge		M	COMESTIBLE
6B3	Amanita citrina	Sous feuillus et conifères, sur sol siliceux.	amanite citrine	Radis pom dt crue	M	SANS INTERET
6B3	Amanita crocea	Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol siliceux.	amanite safran		M	SANS INTERET
6B3	Amanita junquillea	Sous les feuillus et les conifères (surtout pins) sur sol sableux acide.	amanite jonquille		M	TOXIQUE
6B3	Amanita muscaria	Surtout sous conifères et bouleaux sur sol acide (rarement calcaire).	amanite tue-mouches, fausse oronge	-	M	TOXIQUE
6B3	Amanita muscaria f. flavivolvata	Sous conifères (surtout) et sous feuillus.			M	TOXIQUE
6B3	Amanita pantherina	Surtout sous les feuillus, en plaine et en montagne.	amanite panthère	-	M	TOXIQUE
6B3	Amanita rubescens	Sous feuillus et conifères, en tout terrain.	amanite rougissante, golmotte	-	M	COMESTIBLE CUIT
3C1	Armillaria mellea	Surtout sur troncs, souches et racines de feuillus.	armillaire couleur de miel			TOXIQUE
3C1	Armillaria ostoyae	En touffes sur conifères (surtout) et sur feuillus.	armillaire obscure			SANS INTERET
1A	Boletus edulis	Sous les feuillus et les conifères sur sol acide.	cèpe de bordeaux			COMESTIBLE
1A	Boletus pinophilus	Dans les bois de feuillus et de conifères (surtout pins) sur sol acide.	cèpe des pins	écale de noix		COMESTIBLE
24	Calocera viscosa	Sur bois mort de conifères (pins, épicéas,...) et de chênes verts.	calocère visqueuse			TOXIQUE
11B	Calvatia utriformis	Dans les prairies et les champs sur sol acide ou neutre, jusqu'en zone alpine.				SANS INTERET
14	Cantharellus cibarius	Sous feuillus et conifères, surtout sur sol siliceux.	girolle	abricot	M	COMESTIBLE
31C	Chlorociboria aeruginascens	Sur bois pourrissant de feuillus (surtout de hêtres et de chênes).				SANS INTERET
1B	Chroogomphus rutilus	En forêt sous conifères, (surtout pins) rare sous feuillus.	gomphide visqueux	-		SANS INTERET
15	Clavulina cinerea	Surtout dans les bois de feuillus, souvent au bord des chemins.	clavaire cendrée			SANS INTERET
3C1	Clitocybe nebularis	En forêt et dans les parcs sous feuillus et conifères.	clitocybe nébuleux	Poulailler	S	COMESTIBLE
3C1	Clitocybe odora	Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout terrain.	clitocybe odorant	Anis	SH	COMESTIBLE
3C1	Clitocybula lacerata	Sur les souches et les branches mortes, surtout de conifères.	collybie lacerée	Gand de toilette		SANS INTERET
4A	Clitopilus prunulus	Dans l'herbe des prés et des forêts sous feuillus (surtout) et conifères.	meunier	Farine		COMESTIBLE
5A1	Cortinarius purpurascens	Sous feuillus et conifères en tout terrain (surtout acide).	cortinaire pourpre	miel +	M	TOXIQUE
5A1	Cortinarius triumphans	Surtout sous feuillus (bouleaux..) sur sol siliceux.	cortinaire triomphant		M	SANS INTERET
5A1	Cortinarius venetus	Surtout dans les bois de conifères (également sous hêtres).			M	SANS INTERET
14	Craterellus tubaeformis	En groupes sous feuillus et conifères, surtout en terrain siliceux.	chanterelle en tube			COMESTIBLE
3A	Cuphophyllus niveus	Dans l'herbe sur tout type de sol et jusqu'en zone alpine.				COMESTIBLE
8A	Cyathus striatus	En groupe sur branches, brindilles tombées et troncs moussus.	cyathe strié		SX	SANS INTERET
5D	Cyclocybe cylindracea	Surtout sur peupliers morts ou vivants (aussi sureaux, ormes, chênes,...).	pholiote du peuplier	Lait caillé (chapeau)		COMESTIBLE
3D	Cystoderma carcharias	Surtout sous conifères sur sol moussu en montagne (parfois dans les prairies).				SANS INTERET
3D	Cystoderma cinnabarina var. claricolor	Semble lié aux pins.				SANS INTERET
6B2	Echinoderma asperum	Surtout en forêt de feuillus et dans les parcs sur sol calcaire.			SH	TOXIQUE
18	Fomitopsis pinicola	Sur troncs morts, surtout de conifères.	polypore marginé	Poulailler		SANS INTERET
18	Ganoderma carnosum	Sur bois mort surtout de sapins en montagne (très rare sur feuillus).	ganoderme du sapin			SANS INTERET
18	Ganoderma lucidum	Sur et autour des souches de feuillus (rare sur conifères).	ganoderme luisant	-	SX	SANS INTERET
3A	Gliophorus psittacina	Dans l'herbe des prairies et des pelouses, jusqu'en zone alpine.	hygrophore perroquet		S	SANS INTERET
1B	Gomphidius glutinosus	Sous les conifères (surtout épicéas) dans les parcs et les forêts, sur sol acide.	gomphide glutineux			SANS INTERET
5B	Gymnopilus penetrans	A terre ou sur bois, surtout de conifères (vu aussi sur cônes de pin).				SANS INTERET
27B	Gyromitra infula	Sous et sur conifères et hêtres, parfois sur terre brûlée et sur sciure.				MORTEL
1A	Hemileccinum impolitum	Sous les feuillus (rare sous conifères) sur sol calcaire.	bolet dépoli			SANS INTERET
21	Hericium erinaceus	Sur troncs de divers feuillus, surtout de hêtres et de charmes.	hydne hérisson	Lait caillé		COMESTIBLE
1A	Hortiboletus rubellus	Sous les feuillus, surtout sur sol acide (rare sous épicéas).	bolet framboise		M	SANS INTERET
14	Hydnum repandum	Dans les bois de feuillus (surtout) et de conifères.	pied de mouton	fruitée		COMESTIBLE
3A	Hygrocybe chlorophana	Dans l'herbe ou la mousse humide, sous les feuillus et jusqu'en zone alpine.			S	SANS INTERET
1B	Hygrophoropsis aurantiaca	Surtout sous les conifères en terrain acide.	fausse-girolle			COMESTIBLE
3A	Hygrophorus agathosmus	Sous conifères, surtout sur sol calcaire.		Amende amère	M	SANS INTERET

DETERMINATIONS DU 20 10 2024 - EXPOSITION SMBCN / SMAM

Familles	Genres Espèces valides	Habitat	Noms Français	Odeur	Trophisme	COMESTIBLE
3A	Hygrophorus cossus	Surtout sous feuillus sur sol argileux.	hygrophore à odeur de cossus		M	SANS INTERET
3A	Hygrophorus pudorinus	Sous conifères (épicéas), surtout en montagne sur sol calcaire.		Jasmin Térébenthin	M	SANS INTERET
3D	Hymenopellis radicata	Surtout sur bois pourri de hêtres et racines enterrées.	collybie radicante	-		SANS INTERET
5C	Hypholoma fasciculare	En touffe (surtout sur souches) sur feuillus et conifères.	hypholome en touffe	-		TOXIQUE
5C	Hypholoma lateritium	En touffe surtout sur souches de feuillus.	hypholome couleur de brique			TOXIQUE
1A	Imleria badia	Sous feuillus et conifères sur sol acide.	bolet bai		M	COMESTIBLE
3C1	Infundibulicybe gibba	Sous feuillus et conifères en tout terrain et jusqu'en zone alpine.	clitocybe en entonnoir	cyanique	S	COMESTIBLE
5A3	Inocybe geophylla var. lilacina	Sous les feuillus et les conifères.			M	TOXIQUE
5A3	Inocybe godeyi	Surtout sous feuillus sur sol calcaire.	inocybe de godey		M	TOXIQUE
3C1	Laccaria affinis	Dans les zones alpine, subalpine et arctique.			M	SANS INTERET
3C1	Laccaria amethystina	En forêt, sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.	clitocybe laqué améthyste		M	COMESTIBLE
2B	Lactarius albocarneus	Sous conifères (surtout sapins) en montagne.	lactaire glutineux	fruitée	M	SANS INTERET
2B	Lactarius aurantiofulvus	Sous feuillus et sous conifères.	lactaire fauve orangé		M	SANS INTERET
2B	Lactarius blennius	Dans les bois (surtout sous hêtres), sur tout type de sol.	lactaire muqueux	-	M	SANS INTERET
2B	Lactarius controversus	Sous les feuillus, surtout sous peupliers et saules.	lactaire des peupliers		M	SANS INTERET
2B	Lactarius glycosmus	Surtout sous feuillus (bouleaux, ...) sur sol siliceux, souvent en tourbière.	lactaire à odeur de noix de coco	Noix de coco	M	SANS INTERET
2B	Lactarius intermedius	En montagne dans la hêtraie-sapinière sur sol calcaire.	lactaire des sapins	fruitée	M	SANS INTERET
2B	Lactarius necator	Surtout sous les bouleaux, les charmes et les épicéas.	lactaire plombé		M	SANS INTERET
2B	Lactarius salmonicolor	Sous sapins en plaine et en montagne, sur sol acide.	lactaire saumon	fruitée	M	SANS INTERET
2B	Lactarius subdulcis	Surtout sous charmes et hêtres sur tout sol.	lactaire caoutchouc	caoutchouc baudruc	M	SANS INTERET
2B	Lactarius torminosus	Surtout sous bouleaux sur sol siliceux.	lactaire à toison		M	TOXIQUE
2B	Lactarius uvidus	Sous les feuillus et les conifères, surtout sur sol humide acide.	lactaire humide		M	SANS INTERET
2B	Lactifluus vellereus	Surtout sous hêtres, chênes et châtaigniers, parfois sous conifères.	lactaire velouté		M	SANS INTERET
1A	Leccinum scabrum	Sous les feuillus (surtout bouleaux et dans les bois mêlés) sur sol acide.	bolet rude		M	COMESTIBLE
1A	Leccinum versipelle	Sous feuillus (surtout bouleaux) en plaine et sous conifères en montagne.	bolet roux		M	COMESTIBLE
3B	Lentinellus cochleatus	En touffes, surtout sur troncs morts de feuillus (rare sur conifères).	lentin en colimaçon	anisée		SANS INTERET
6B2	Lepiota ignivolata	Sous conifères (surtout) et feuillus sur sol calcaire.	lépiote à base couleur de feu	caoutchouc	S	TOXIQUE
3C1	Lepista inversa	Sous les conifères (surtout épicéas), rarement sous feuillus.	clitocybe inverse		S	COMESTIBLE
3C1	Lepista nuda	Sous feuillus et conifères sur tout terrain et jusqu'en zone alpine.	piet bleu	Pharmacie VitB1	S	COMESTIBLE
6B2	Leucoagaricus leucothites	Surtout dans les prés, les pelouses, les jardins et en bordure de bois.	lépiote pudique			COMESTIBLE
3C2	Leucopaxillus gentianeus	Dans l'herbe sous les conifères (surtout) et les feuillus.		concombre +	SH	SANS INTERET
11B	Lycoperdon perlatum	A terre dans les forêts de feuillus et de conifères (parfois sur bois pourri).	vesse de loup perlée	-	SH	SANS INTERET
3C3	Lyophyllum connatum	Dans l'herbe sous feuillus et conifères en montagne.		petits poids crus		TOXIQUE
6B2	Macrolepiota procera	Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide (parfois en prairie).	coulemelle ; lépiote élevée		SH	COMESTIBLE
6B2	Macrolepiota procera var. fuliginosa	Dans l'herbe en lisière de forêts, surtout de feuillus (rares sous épicéas).				COMESTIBLE
3E	Marasmius oreades	Dans l'herbe des pelouses ou des prés (rare sous épicéas).	marasme des oréades	Amende amère	SH	COMESTIBLE
3D	Mucidula mucida	Sur branches et troncs (morts ou vivants) surtout de hêtres.	collybie visqueuse		S	SANS INTERET
3E	Mycena galericulata	Sur souches et branches mortes, surtout de feuillus.	mycène casquée		SX	SANS INTERET
3E	Mycena pura	Sous feuillus et conifères, sur tout sol, jusqu'en zone alpine	mycène pure	Radis	SH	TOXIQUE
3E	Mycena rosea	Surtout sous les hêtres sur sol calcaire, parfois siliceux.	mycène pure forme rose	radis +	S	TOXIQUE
1A	Neoboletus erythropus	Sous feuillus et conifères sur sols calcaires et siliceux.	bolet à pied rouge	-		COMESTIBLE
27D	Otidea bufonia	Dans les bois de feuillus et mêlés.				SANS INTERET
1B	Paxillus involutus	Sous feuillus (surtout) et conifères, généralement sur sol acide.	paxille enroulé			toxique/MORTEL cru
1B	Paxillus rubicundulus	Sous feuillus (surtout aulnes) et conifères.			M	TOXIQUE
18	Phaeolus schweinitzii	Surtout à la base des conifères (rare dessus), parfois sur souches.	polypore éponge	-		SANS INTERET
5C	Pholiota lenta	Surtout sous les hêtres (parfois sur ou sous conifères).				SANS INTERET
5C	Pholiota squarrosa	En touffes à la base des feuillus et des conifères morts ou vivants.	pholiote squarreuse	-		SANS INTERET
18	Piptoporus betulinus	Sur troncs et souches, surtout de bouleaux, morts ou vivants.	polypore du bouleau	fruitée		SANS INTERET
3B	Pleurotus ostreatus	En touffes, surtout sur troncs de feuillus morts ou vivants.	pleurote en huître			COMESTIBLE
4C	Pluteus cervinus	Sur bois pourri, surtout de feuillus.	plutée couleur de cerf	Radis	SX	SANS INTERET
3C1	Pseudoclitocybe cyathiformis	En forêt, sous feuillus (surtout) et conifères sur sol calcaire.	clitocybe en coupe			SANS INTERET
18	Pycnoporus cinnabarinus	Sur bois mort, surtout de feuillus (parfois clôtures).	tramète cinabre	-		SANS INTERET

DETERMINATIONS DU 20 10 2024 - EXPOSITION SMBCN / SMAM

Familles	Genres Espèces valides	Habitat	Noms Français	Odeur	Trophisme	COMESTIBLE
15	Ramaria botrytis	Surtout sous les feuillus sur sol acide (plus rare sous conifères).	clavaire choux-fleur			COMESTIBLE
1A	Rheubarbariboletus armeniacus	Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol sableux acide.	bolet abricot		M	SANS INTERET
3E	Rhodocollybia butyracea	Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.	collybie beurrée		SH	SANS INTERET
2A	Russula aeruginea	Sous bouleaux, chênes, pins et épicéas, (surtout en montagne) sur sol acide.	russule verdâtre		M	SANS INTERET
2A	Russula amoenolens	Sous les feuillus (surtout) et sous les pins, sur sol acide ou neutre.	russule à odeur de topinambour	artichaud spermatique	M	SANS INTERET
2A	Russula badia	Sous les conifères (parfois avec hêtres), surtout en montagne sur sol siliceux.	russule perfide	bois de crayon	M	SANS INTERET
2A	Russula cavipes	Dans les pessières et les sapinières humides sur sol calcaire.	russule à pied creux		M	SANS INTERET
2A	Russula cyanoxantha	Sous les feuillus (surtout) et les conifères, sur sol légèrement acide.	russule charbonnière	-	M	COMESTIBLE
2A	Russula decipiens	Sous les feuillus (surtout chênes) sur sol acide ou neutre.	russule trompeuse		M	SANS INTERET
2A	Russula fageticola	Sous les feuillus (surtout hêtres).	russule émétique des hêtres	Noix de coco	M	SANS INTERET
2A	Russula fellea	Sous les feuillus (surtout hêtres) et sous les conifères, sur tout sol.	russule de fiel	compote de pomme	M	SANS INTERET
2A	Russula foetens	Sous les feuillus et les conifères.	russule fétide	plume brûlée	M	TOXIQUE
2A	Russula graveolens	Sous les feuillus (surtout chênes) sur sol siliceux.	russule malodorante	crustacés cuits	M	SANS INTERET
2A	Russula ilicis	Sous les chênes verts (QUERCUS ILEX) et les chênes pubescents sur sol calcaire.	russule des chênes verts		M	COMESTIBLE
2A	Russula insignis	Dans les forêts mêlées hygrophiles (surtout sous les chênes).	russule à voile jaune	pomme -	M	SANS INTERET
2A	Russula integra	Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).	russule des épicéas		M	SANS INTERET
2A	Russula lepida	Sous les feuillus et les conifères, surtout sur sol siliceux.	russule jolie	mentholée -	M	SANS INTERET
2A	Russula mustelina	Sous conifères (surtout épicéas) en montagne.	russule belette	-	M	COMESTIBLE
2A	Russula nigricans	Sous les feuillus et les conifères.	russule noircissante		M	SANS INTERET
2A	Russula ochroleuca	Sous les feuillus et les conifères.	russule ocre et blanche		M	SANS INTERET
2A	Russula olivacea	Sous hêtres ou chênes en plaine et sous épicéas ou sapins en montagne.	russule olivacée	-	M	TOXIQUE
2A	Russula sanguinaria	Sous les conifères (pins surtout), rare sous feuillus, jusqu'en zone alpine..	russule sanguine	pomme -	M	TOXIQUE
2A	Russula sardonica	Dans les pinèdes sablonneuses acides en plaine.	russule sardoine	fruitée	M	SANS INTERET
2A	Russula torulosa	Dans les pinèdes sablonneuses et sous chênes verts sur tout sol.	russule des pinèdes	Pomme +	M	SANS INTERET
2A	Russula vesca	Surtout sous les chênes en plaine sur sol neutre ou acide	russule vieux-rose		M	COMESTIBLE
2A	Russula vinosobrunnea	Sous feuillus (surtout hêtres), surtout sur sol argilo-siliceux.	russule brun vineux		M	SANS INTERET
2A	Russula xerampelina	Sous feuillus (surtout) et sous conifères.	russule écrevisse		M	SANS INTERET
10A	Scleroderma citrinum	Sous feuillus, conifères et dans les prairies sur sol sablonneux acide.	scléroderme commun		M	TOXIQUE
18	Scutigera cristatus	A terre, surtout sous épicéas et chênes.	polypore craquelé			SANS INTERET
15	Sparassis brevipes	A terre, surtout à la base des chênes.	sparassis lamelleux	Eau de Javel		COMESTIBLE
15	Sparassis crispa	Sur ou près des souches de conifères, parasite des racines.	sparassis crépu	Cannelle		COMESTIBLE
21	Stereum hirsutum	Surtout sur feuillus, morts ou vivants (rare sur épicéas et pins).			SX	SANS INTERET
5C	Stropharia aeruginosa	A terre dans les forêts (surtout de feuillus), les parcs et les prés.	strophaire vert de gris		S	TOXIQUE
5C	Stropharia caerulea	Surtout sous hêtres sur sol calcaire (décharges, bords de routes,...).			SH	TOXIQUE
1A	Suillus bovinus	Dans les bois de pins siliceux (plus rare sous épicéas).	bolet des bouviers		M	SANS INTERET
1A	Suillus granulatus	Sous les pins et les cistes dans les bois et les parcs surtout sur sol calcaire.	bolet granulé	-	M	SANS INTERET
1A	Suillus luteus	Sous les pins sur sol sablonneux acide.	nonnette voilée		M	COMESTIBLE
18	Trametes versicolor	Sur bois mort ou vivant, surtout de feuillus.	tramète versicolore		SX	SANS INTERET
3C2	Tricholoma album	Surtout sous feuillus sur sol sablonneux acide.	tricholome blanc	gaz iris	M	TOXIQUE
3C2	Tricholoma columbetta	Sous feuillus (surtout chênes) sur sol acide (rare sous conifères).	tricholome colombette	Farine	M	COMESTIBLE
3C2	Tricholoma pardinum	Surtout sous les conifères en montagne, sur sol calcaire.		farineuse	M	TOXIQUE
3C2	Tricholoma pessundatum	Sous les pins, les cèdres et les épicéas.		Farine	M	TOXIQUE
3C2	Tricholoma portentosum	Sous conifères (surtout) et feuillus sur sol acide.	tricholome prétentieux	Farine	M	COMESTIBLE
3C2	Tricholoma saponaceum	Dans les bois de feuillus (chênes surtout) et de conifères.	tricholome à odeur de savon	Savon	M	SANS INTERET
3C2	Tricholoma sulphureum	Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.	tricholome soufré	gaz souffre	M	TOXIQUE
3C2	Tricholomopsis rutilans	Sur souches et racines de conifères.	tricholome rutilant	-		SANS INTERET
1A	Xerocomellus chrysenteron	Sous feuillus (surtout) et conifères sur tout sol.	bolet à chair jaune		M	COMESTIBLE
1A	Xerocomellus pruinatus	Sous feuillus et conifères sur tout sol.	bolet pruineux		M	SANS INTERET
1A	Xerocomus subtomentosus	Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.	bolet tomenteux		M	COMESTIBLE